

Sur les algèbres de Lie quasi-filiformes admettant un tore de dérivations

L. García Vergnolle*
 Dpto. Geometría y Topología,
 Facultad de Ciencias Matemáticas U.C.M.
 Plaza de Ciencias 3, 28040 Madrid Espagne

Abstract

Dans ce travail on décrit les algèbres de Lie quasi-filiformes de rang non nul. De plus, on rappelle et corrige la classification des algèbres de Lie filiformes admettant un tore de dérivations, ainsi que la liste des algèbres graduées naturellement et quasi-filiformes.

1 Introduction

Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie nilpotente de dimension n et nilindice m , elle est naturellement filtrée par la suite centrale descendante:

$$\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g} \supseteq \mathfrak{g}_2 = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \supseteq \mathfrak{g}_3 = [\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}] \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{g}_{k+1} = [\mathfrak{g}_k, \mathfrak{g}] \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{g}_{m+1} = \{0\}$$

On peut alors associer une algèbre de Lie graduée, notée par $gr(\mathfrak{g})$, et définie par:

$$gr\mathfrak{g} = \sum_{i=1}^m \frac{\mathfrak{g}_i}{\mathfrak{g}_{i+1}} = \sum_{i=1}^m W_i$$

où le crochet est donné par:

$$[X + \mathfrak{g}_{i+1}, Y + \mathfrak{g}_{j+1}] = [X, Y] + \mathfrak{g}_{i+j+1} \quad \forall X \in \mathfrak{g}_i \quad \forall Y \in \mathfrak{g}_j$$

On dit que $\mathfrak{g}$ est une algèbre du type $\{p_1, \dots, p_m\}$ si $\dim \frac{\mathfrak{g}_i}{\mathfrak{g}_{i+1}} = p_i$. Remarquons que $gr(\mathfrak{g})$ est du même type que $\mathfrak{g}$.

Définition 1 Une algèbre de Lie nilpotente de dimension n est dite filiforme si son nilindice est $n - 1$, c'est-à-dire si elle est du type $\{2, 1, 1, \dots, 1\}$

*e-mail: lucigarcia@mat.ucm.es

On en déduit que l'algèbre graduée d'une algèbre filiforme est aussi filiforme.

Définition 2 Une algèbre $\mathfrak{g}$ est graduée naturellement quand elle est isomorphe à $\text{gr } \mathfrak{g}$.

Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ graduée naturellement peut alors se décomposer de la forme $\mathfrak{g} = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_m$ où les $W_i = \frac{\mathfrak{a}_i}{\mathfrak{g}_{i+1}}$ vérifient $[W_i, W_j] = W_{i+j}$ pour $i + j \leq m$.

La classification des algèbres de Lie filiformes graduées naturellement est due à Vergne [7].

Théorème 1 Toute algèbre de Lie filiforme et graduée naturellement est isomorphe à une des algèbres suivantes:

1. L_n ($n \geq 3$) définie dans la base $\{X_0, X_1, \dots, X_{n-1}\}$ par:

$$[X_0, X_i] = X_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-2.$$

(les crochets non écrits étant nuls, exceptés ceux découlant de l'antisymétrie)

2. Q_n ($n = 2m$, $m \geq 3$) définie dans la base $\{X_0, X_1, \dots, X_{n-1}\}$ par:

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-3, \\ [X_j, X_{n-j-1}] &= (-1)^{j-1} X_{n-1}, \quad 1 \leq j \leq m-1. \end{aligned}$$

En conséquence, sauf isomorphisme, il existe deux algèbres filiformes graduées naturellement de dimension paire y une seule algèbre filiforme graduée naturellement de dimension impaire.

Proposition 1 [4] Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie filiforme de dimension n admettant une dérivation diagonale f non nulle. Il existe alors une base de $\mathfrak{g}$, $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-1}\}$, formée de vecteurs propres de f dont les crochets vérifient l'un des cas suivants:

1. $\mathfrak{g} = L_n$, $n \geq 3$

$$[Y_0, Y_i] = Y_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-2$$

2. $\mathfrak{g} = A_n^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1})$, $n \geq 3$, $t = \frac{n-k+1}{2}$, $2 \leq k \leq n-3$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-2, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & 1 \leq i \leq t-1, \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j, \quad i+j \leq n-k \end{aligned}$$

3. $\mathfrak{g} = Q_n$, $n = 2m$, $m \geq 3$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-3, \\ [Y_j, Y_{n-j-1}] &= (-1)^{j-1} Y_{n-1}, & 1 \leq j \leq m-1 \end{aligned}$$

4. $\mathfrak{g} = B_n^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1})$, $n = 2m$, $m \geq 3$, $t = \frac{n-k}{2}$, $2 \leq k \leq n-3$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-3, \\ [Y_j, Y_{n-j-1}] &= (-1)^{j-1} Y_{n-1}, & 1 \leq j \leq m-1, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & 1 \leq i \leq t-1, \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j, i+j \leq n-k-1 \end{aligned}$$

où $(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1})$ sont des paramètres vérifiant les relations polynomiales découlant des identités de Jacobi et les constantes $a_{i,j}$ vérifient le système:

$$\begin{aligned} a_{i,i} &= 0, \\ a_{i,i+1} &= \alpha_i, \\ a_{i,j} &= a_{i+1,j} + a_{i,j+1}. \end{aligned}$$

De plus, si λ_0 et λ_1 représentent les valeurs propres de f associées respectivement aux vecteurs propres Y_0 et Y_1 , alors f prend, dans chacun des cas, la forme diagonale suivante:

1. $f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-2)\lambda_0 + \lambda_1)$
2. $f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (k+2)\lambda_0, \dots, (n+k-2)\lambda_0)$
3. $f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-3)\lambda_0 + \lambda_1, (n-3)\lambda_0 + 2\lambda_1)$
4. $f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (k+2)\lambda_0, \dots, (n+k-3)\lambda_0, (n+2k-3)\lambda_0)$

Remarque 1 Dans la référence [4], on considère aussi les algèbres $C_n(\alpha_1, \dots, \alpha_{m-2})$ où $n = 2m$, définies dans la base $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-1}\}$ par:

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-3, \\ [Y_i, Y_{n-i-1}] &= (-1)^i Y_{n-1}, & 1 \leq i \leq m-1, \\ [Y_i, Y_{n-(2k+1)-i}] &= (-1)^{i+1} \alpha_k Y_{n-1}, & 1 \leq i \leq m-k-1, 1 \leq k \leq m-2. \end{aligned}$$

Il existe un changement de variable tel que ces algèbres adoptent la même forme avec $\alpha_1 = \dots = \alpha_{m-2} = 0$. En effet, pour éliminer le paramètre α_1 , il suffit de faire le changement de variable suivant:

$$\begin{aligned} Z_0 &= Y_0, \\ Z_1 &= Y_1 + \frac{\alpha_1}{2} Y_3, \\ Z_{i+1} &= [Z_0, Z_i], \quad 1 \leq i \leq n-3, \\ Z_{n-1} &= Y_{n-1}, \end{aligned}$$

et, de plus, si $\alpha_{j+1} = \dots = \alpha_{m-2} = 0$, le changement de variable $Y_i \rightarrow Y_i + \frac{\alpha_j}{2} Y_{i+2j}$ pour $i = 1, \dots, n-2-2j$, nous permet annuler le paramètre α_j . On en conclut que les algèbres C_n sont isomorphes à Q_n ; désormais les algèbres de la forme C_n ne sont pas de rang 1 mais de rang 2.

Le but de ce travail est de donner la classification des algèbres quasi-filiformes de rang non nul.

2 Algèbres de Lie quasi-filiformes et bases adaptées

De façon analogue à Vergne, ont été obtenues les algèbres de Lie graduées naturellement et quasi-filiformes que l'on définit ci-dessous [2].

Définition 3 Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre nilpotente de dimension n , on dit que $\mathfrak{g}$ est quasi-filiforme si son nilindice est $n - 2$.

Si une algèbre $\mathfrak{g}$ est quasi-filiforme, en suivant les notations précédentes, il existe deux possibilités:

1. Soit $\mathfrak{g}$ est du type $t_1 = \{p_1 = 3, p_2 = 1, p_3 = 1, \dots, p_{n-2} = 1\}$.
2. Soit $\mathfrak{g}$ est du type $t_r = \{p_1 = 2, p_2 = 1, \dots, p_{r-1} = 1, p_r = 2, p_{r+1} = 1, \dots, p_{n-2} = 1\}$ où $r \in \{2, \dots, n-2\}$.

Proposition 2 [2] Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie quasi-filiforme graduée naturellement de dimension n et du type t_r où $r \in \{1, \dots, n-2\}$. Il existe alors une base homogène $\{X_0, X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}$ de $\mathfrak{g}$ avec X_0 et X_1 dans W_1 , $X_i \in W_i$ pour $i \in \{2, \dots, n-2\}$ et $X_{n-1} \in W_r$ dans laquelle $\mathfrak{g}$ est une des algèbres décrites ci-dessous.

1. $\mathfrak{g}$ est du type t_1

$$(a) L_{n-1} \oplus \mathbb{C} \quad (n \geq 4)$$

$$[X_0, X_i] = X_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-3.$$

$$(b) Q_{n-1} \oplus \mathbb{C} \quad (n \geq 7, n \text{ impair})$$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [X_i, X_{n-i-2}] &= (-1)^{i-1} X_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}. \end{aligned}$$

2. $\mathfrak{g}$ est du type t_r où $r \in \{2, \dots, n-2\}$

$$(a) \mathfrak{L}_{n,r}; \quad n \geq 5, r \text{ impair}, 3 \leq r \leq 2\left[\frac{n-1}{2}\right] - 1$$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, \dots, n-3 \\ [X_i, X_{r-i}] &= (-1)^{i-1} X_{n-1}, & i = 1, \dots, \frac{r-1}{2} \end{aligned}$$

$$(b) \mathfrak{Q}_{n,r}; \quad n \geq 7, n \text{ impair}, r \text{ impair}, 3 \leq r \leq n-4$$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, \dots, n-4 \\ [X_i, X_{r-i}] &= (-1)^{i-1} X_{n-1}, & i = 1, \dots, \frac{r-1}{2} \\ [X_i, X_{n-2-i}] &= (-1)^{i-1} X_{n-2}, & i = 1, \dots, \frac{n-3}{2} \end{aligned}$$

$$(c) \mathfrak{T}_{n,n-4}; \quad n \geq 7, n \text{ impair}$$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, \dots, n-5 \\ [X_0, X_{n-3}] &= X_{n-2}, \\ [X_0, X_{n-1}] &= X_{n-3}, \\ [X_i, X_{n-4-i}] &= (-1)^{i-1} X_{n-1}, & i = 1, \dots, \frac{n-5}{2} \\ [X_i, X_{n-3-i}] &= (-1)^{i-1} \frac{n-3-2i}{2} X_{n-3}, & i = 1, \dots, \frac{n-5}{2} \\ [X_i, X_{n-2-i}] &= (-1)^i (i-1) \frac{n-3-i}{2} X_{n-2}, & i = 2, \dots, \frac{n-3}{2} \end{aligned}$$

(d) $\mathfrak{T}_{n,n-3}; \quad n \geq 6, n \text{ pair}$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i &= 1, \dots, n-4 \\ [X_0, X_{n-1}] &= X_{n-2}, \\ [X_i, X_{n-3-i}] &= (-1)^{i-1} X_{n-1}, & i &= 1, \dots, \frac{n-4}{2} \\ [X_i, X_{n-2-i}] &= (-1)^{i-1} \frac{n-2-2i}{2} X_{n-2}, & i &= 1, \dots, \frac{n-4}{2} \end{aligned}$$

(e) $\mathfrak{E}_{9,5}^1$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ [X_0, X_8] &= X_6, & [X_2, X_8] &= -3X_7, \\ [X_1, X_4] &= X_8, & [X_1, X_5] &= 2X_6, \\ [X_1, X_6] &= 3X_7, & [X_2, X_3] &= -X_8, \\ [X_2, X_4] &= -X_6, & [X_2, X_5] &= -X_7. \end{aligned}$$

(f) $\mathfrak{E}_{9,5}^2$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ [X_0, X_8] &= X_6, & [X_2, X_8] &= -X_7, \\ [X_1, X_4] &= X_8, & [X_1, X_5] &= 2X_6, \\ [X_1, X_6] &= X_7, & [X_2, X_3] &= -X_8, \\ [X_2, X_4] &= -X_6, & [X_2, X_5] &= X_7, \\ [X_3, X_4] &= -2X_7. \end{aligned}$$

(g) $\mathfrak{E}_{9,5}^3$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ [X_0, X_8] &= X_6, & [X_1, X_4] &= X_8, \\ [X_1, X_5] &= 2X_6, & [X_2, X_3] &= -X_8, \\ [X_2, X_4] &= -X_6, & [X_2, X_5] &= 2X_7, \\ [X_3, X_4] &= -3X_7. \end{aligned}$$

(h) $\mathfrak{E}_{7,3}$

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4 \\ [X_0, X_6] &= X_4, & [X_2, X_6] &= -X_5, \\ [X_1, X_2] &= X_6, & [X_1, X_3] &= X_4, \\ [X_1, X_4] &= X_5. \end{aligned}$$

On en déduit qu'il n'y a pas d'algèbres quasi-filiformes du type t_2 .

Remarque 2 *L'algèbre $\mathfrak{E}_{9,5}^3$ ne se trouve pas dans la classification [2]. En effet, quand on cherche les algèbres de dimension 9 ayant une dérivation diagonale de la forme $\text{diag}(1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5)$, on obtient facilement trois algèbres spéciales, isomorphes respectivement à $\mathfrak{E}_{9,5}^1$, $\mathfrak{E}_{9,5}^2$ et $\mathfrak{E}_{9,5}^3$. De plus, cette algèbre est d'une importance considérable dans le problème de rigidité [3] [5].*

Corollaire 1 *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie quasi-filiforme graduée naturellement de dimension n . Alors, grg est isomorphe à l'une des algèbres de la proposition*

2, $C_{i,j}^k$ dénotent les constantes de structure de cette algèbre dans la base où on l'a définie. Il existe alors une base $\{X_0, X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}$ de $\mathfrak{g}$ telle que:

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] - \sum_{k=0}^{n-1} C_{0,i}^k X_k &\in \mathfrak{g}_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-3, \\ [X_i, X_j] - \sum_{k=0}^{n-1} C_{i,j}^k X_k &\in \mathfrak{g}_{i+j}, & 1 \leq i < j \leq n-2-i, \\ [X_i, X_{n-1}] - \sum_{k=0}^{n-1} C_{i,n-1}^k X_k &\in \mathfrak{g}_{i+r}, & 1 \leq i \leq n-2-r, \\ [X_i, X_{n-2}] &= 0, & 0 \leq i \leq n-1, \end{aligned}$$

et, de plus:

1. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{L}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$,

$$[X_0, X_i] = X_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-3,$$

2. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{Q}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [X_1, X_{n-2}] &= X_{n-2}, \end{aligned}$$

3. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{L}_{n,r}$,

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, \dots, n-3 \\ [X_1, X_{r-1}] &= X_{n-1}, \end{aligned}$$

4. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{Q}_{n,r}$,

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, \dots, n-4 \\ [X_1, X_{r-1}] &= X_{n-1}, \\ [X_1, X_{n-3}] &= X_{n-2}, \end{aligned}$$

5. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{T}_{n,n-4}$,

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, \dots, n-5 \\ [X_0, X_{n-3}] &= X_{n-2}, \\ [X_0, X_{n-1}] &= X_{n-3}, \\ [X_1, X_{n-5}] &= X_{n-1} \end{aligned}$$

6. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{T}_{n,n-3}$,

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, \dots, n-4 \\ [X_0, X_{n-1}] &= X_{n-2}, \\ [X_1, X_{n-4}] &= X_{n-1}, \end{aligned}$$

7. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{E}_{9,5}^j$ avec $j \in \{1, 2, 3\}$,

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ [X_1, X_4] &= X_8, \end{aligned}$$

8. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{E}_{7,3}$,

$$\begin{aligned} [X_0, X_i] &= X_{i+1}, & i = 1, 2, 3, 4 \\ [X_1, X_2] &= X_6. \end{aligned}$$

La base $\{X_0, X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}$ ainsi définie est appelée base adaptée.

3 Classification des algèbres de Lie quasi-filiformes de rang non nul

Rappelons qu'un tore maximal de dérivations de $\mathfrak{g}$ est une sous algèbre abélienne maximale de l'algèbre des dérivations $Der(\mathfrak{g})$ formée de dérivations ad-diagonalisables [6]. Tous ces tores maximaux sont conjugués par automorphismes, ce qui permet de définir le rang d'une algèbre de Lie comme la dimension commune des tores maximaux de $\mathfrak{g}$.

Théorème 2 *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie quasi-filiforme de dimension n admettant une dérivation diagonale f non nulle. Il existe alors une base de $\mathfrak{g}$, $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-1}\}$, formée de vecteurs propres de f dont les crochets vérifient l'un des cas suivants:*

1. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{L}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$ ($n \geq 4$),

- (a) $\mathfrak{g} = L_{n-1} \oplus \mathbb{C}$

$$[Y_0, Y_i] = Y_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq n-3,$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-3)\lambda_0 + \lambda_1, \lambda_{n-1})$$

- (b) $\mathfrak{g} = A_{n-1}^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}) \oplus \mathbb{C}, \quad t = \frac{n-k}{2}, \quad 2 \leq k \leq n-4$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-3, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & 1 \leq i \leq t-1, \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j, \quad i+j \leq n-k-1, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (k+2)\lambda_0, \dots, (k+n-3)\lambda_0, \lambda_{n-1})$$

- (c) $\mathfrak{g} = L_{n-1} \overrightarrow{\oplus}_l \mathbb{C} \quad (2 \leq l \leq n-3)$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-3, \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{i+l-2}, & 1 \leq i \leq n-l, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-3)\lambda_0 + \lambda_1, l\lambda_0)$$

- (d) $\mathfrak{g} = A_{n-1}^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}) \overrightarrow{\oplus}_l \mathbb{C} \quad t = \frac{n-k}{2} \quad 2 \leq k \leq n-4 \quad 2 \leq l \leq n-3$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-3, \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{i+l-2}, & 1 \leq i \leq n-l, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & 1 \leq i \leq t-1, \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j, \quad i+j \leq n-k-1, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (k+2)\lambda_0, \dots, (k+n-3)\lambda_0, l\lambda_0)$$

2. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{Q}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$ ($n \geq 7$, n impair),

$$(a) \mathfrak{g} = Q_{n-1} \oplus \mathbb{C}$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [Y_i, Y_{n-i-1}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-4)\lambda_0 + \lambda_1, (n-4)\lambda_0 + 2\lambda_1, \lambda_{n-1})$$

$$(b) \mathfrak{g} = B_{n-1}^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}) \oplus \mathbb{C} \quad t = \frac{n-k-1}{2} \quad 2 \leq k \leq n-5$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [Y_i, Y_{n-i-2}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k-1}, & 1 \leq i \leq t-1, \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j, \quad i+j \leq n-k-2, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (k+2)\lambda_0, \dots, (n-4+k)\lambda_0, (n-4+2k)\lambda_0, \lambda_{n-1})$$

$$(c) \mathfrak{g} = Q_{n-1} \overset{\rightarrow}{\oplus}_l^a \mathbb{C} \quad 2 \leq l \leq n-4$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [Y_i, Y_{n-i-2}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}, \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{i+l}, & 1 \leq i \leq n-l-3, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-4)\lambda_0 + \lambda_1, (n-4)\lambda_0 + 2\lambda_1, l\lambda_0)$$

$$(d) \mathfrak{g} = B_{n-1}^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}) \overset{\rightarrow}{\oplus}_l^a \mathbb{C} \quad t = \frac{n-k-1}{2} \quad 2 \leq k \leq n-5, \quad 2 \leq l \leq n-4$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [Y_i, Y_{n-i-2}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & 1 \leq i \leq t-1, \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j, \quad i+j \leq n-k-2, \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{i+l}, & 1 \leq i \leq n-l-3, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (k+2)\lambda_0, \dots, (n-4+k)\lambda_0, (n-4+2k)\lambda_0, l\lambda_0)$$

$$(e) \mathfrak{g} = Q_{n-1} \overset{\rightarrow}{\oplus}_l^b \mathbb{C} \quad 2 \leq l \leq n-4$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [Y_i, Y_{n-i-2}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}, \\ [Y_0, Y_{n-1}] &= Y_{n-2}, \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{i+l}, & 1 \leq i \leq n-l-3, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \beta\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (\beta+2)\lambda_0, \dots, (n-4+\beta)\lambda_0, (n-4+2\beta)\lambda_0, (n-5+2\beta)\lambda_0)$$

$$\text{où } \beta = \frac{l-n+5}{2}$$

$$(f) \mathfrak{g} = Q_{n-1} \overset{\rightarrow}{\oplus}^c \mathbb{C}$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [Y_i, Y_{n-i-2}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}, \\ [Y_0, Y_{n-1}] &= Y_{n-2}, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-4)\lambda_0\lambda_1, (n-4)\lambda_0 + 2\lambda_1, (n-5)\lambda_0 + 2\lambda_1)$$

$$(g) \quad \mathfrak{g} = B_{n-1}^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}) \overrightarrow{\oplus}^c \mathbb{C} \quad t = \frac{n-k-1}{2} \quad 2 \leq k \leq n-5$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-4, \\ [Y_i, Y_{n-i-2}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & 1 \leq i \leq \frac{n-3}{2}, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & 1 \leq i \leq t-1, \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j, \quad i+j \leq n-k-2, \\ [Y_0, Y_{n-1}] &= Y_{n-2}, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (k+1)\lambda_0, (k+2)\lambda_0, \dots, (n-4+k)\lambda_0, (n-4+2k)\lambda_0, (n-5+2k)\lambda_0)$$

$$3. \text{ Si } \text{grg} \simeq \mathfrak{L}_{n,r} \quad (n \geq 5, r \text{ impair}, 3 \leq r \leq 2[\frac{n-1}{2}] - 1),$$

$$(a) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{L}_{n,r}$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i = 1, \dots, n-3, \\ [Y_i, Y_{r-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i = 1, \dots, \frac{r-1}{2} \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-3)\lambda_0 + \lambda_1, (r-2)\lambda_0 + 2\lambda_1)$$

$$(b) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{C}_{n,r}^t(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}), \quad 2 \leq k \leq n-4, \quad t = [\frac{n-k}{2}]$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i = 1, \dots, n-3 \\ [Y_i, Y_{r-i}] &= \begin{cases} (-1)^{i-1} Y_{n-1} + a_{i,r-i} Y_{r+k-1} & \text{si } k \leq n-r-1, \quad i = 1, \dots, \frac{r-1}{2} \\ (-1)^{i-1} Y_{n-1} & \text{si } k > n-r-1, \quad i = 1, \dots, \frac{r-1}{2} \end{cases} \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & i = 1, \dots, t-1 \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j < n-1, \quad r \neq i+j \leq n-k-1, \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{2k+r+i-2}, & i = 1, \dots, n-r-2k \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (1+k)\lambda_0, (2+k)\lambda_0, \dots, (n-3+k)\lambda_0, (r-2+2k)\lambda_0)$$

$$(c) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{D}_{n,r}^t, \quad 1 \leq k \leq [\frac{n-r-2}{2}]$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i = 1, \dots, n-3 \\ [Y_i, Y_{r-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i = 1, \dots, \frac{r-1}{2} \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{2k+r+i-1}, & i = 1, \dots, n-r-2k-1 \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, (k+\frac{1}{2})\lambda_0, (k+\frac{3}{2})\lambda_0, (k+\frac{5}{2})\lambda_0, \dots, (k+\frac{2n-5}{2})\lambda_0, (r-1+2k)\lambda_0)$$

$$4. \text{ Si } \text{grg} \simeq \mathfrak{Q}_{n,r} \quad (n \geq 7, n \text{ impair}, r \text{ impair}, 3 \leq r \leq n-4),$$

$$(a) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{Q}_{n,r}$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i = 1, \dots, n-4 \\ [Y_i, Y_{r-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i = 1, \dots, \frac{r-1}{2} \\ [Y_i, Y_{n-2-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & i = 1, \dots, \frac{n-3}{2} \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-4)\lambda_0 + \lambda_1, (n-4)\lambda_0 + 2\lambda_1, (r-2)\lambda_0 + 2\lambda_1)$$

$$(b) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{E}_{n,r}^t(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}), \quad 2 \leq k \leq n-5, \quad t = \lfloor \frac{n-k-1}{2} \rfloor$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, \dots, n-4 \\ [Y_i, Y_{r-i}] &= \begin{cases} (-1)^{i-1} Y_{n-1} + a_{i,r-i} Y_{r+k-1} & \text{if } k \leq n-r-2, \\ (-1)^{i-1} Y_{n-1} & \text{if } k > n-r-2, \end{cases} & i &= 1, \dots, \frac{r-1}{2} \\ [Y_i, Y_{n-2-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & i &= 1, \dots, \frac{n-3}{2} \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & i &= 1, \dots, t-1 \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j < n-1, \quad r \neq i+j \leq n-k-2 \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{2k+r+i-2}, & i &= 1, \dots, n-r-2k-1 \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (1+k)\lambda_0, (2+k)\lambda_0, \dots, (n-4+k)\lambda_0, (n-4+2k)\lambda_0, (r-2+2k)\lambda_0)$$

$$(c) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{F}_{n,r}^t, \quad 1 \leq k \leq \lfloor \frac{n-r-4}{2} \rfloor$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, \dots, n-4 \\ [Y_i, Y_{r-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i &= 1, \dots, \frac{r-1}{2} \\ [Y_i, Y_{n-2-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-2}, & i &= 1, \dots, \frac{n-3}{2} \\ [Y_i, Y_{n-1}] &= Y_{2k+r+i-1}, & i &= 1, \dots, n-r-2k-2 \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, (k+\frac{1}{2})\lambda_0, (k+\frac{3}{2})\lambda_0, (k+\frac{5}{2})\lambda_0, \dots, (k+\frac{2n-7}{2})\lambda_0, (n+2k-3)\lambda_0, (r+2k-1)\lambda_0)$$

5. *Si* $\text{grg} \simeq \mathfrak{T}_{n,n-4}$ ($n \geq 7$, n *impair*),

$$(a) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{T}_{n,n-4}$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, \dots, n-5 \\ [Y_0, Y_{n-3}] &= Y_{n-2}, \\ [Y_0, Y_{n-1}] &= Y_{n-3}, \\ [Y_i, Y_{n-4-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i &= 1, \dots, \frac{n-5}{2} \\ [Y_i, Y_{n-3-i}] &= (-1)^{i-1} \frac{n-3-2i}{2} Y_{n-3}, & i &= 1, \dots, \frac{n-5}{2} \\ [Y_i, Y_{n-2-i}] &= (-1)^i (i-1) \frac{n-3-i}{2} Y_{n-2}, & i &= 2, \dots, \frac{n-3}{2} \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0+\lambda_1, 2\lambda_0+\lambda_1, \dots, (n-5)\lambda_0+\lambda_1, (n-5)\lambda_0+2\lambda_1, (n-4)\lambda_0+2\lambda_1, (n-6)\lambda_0+2\lambda_1)$$

$$(b) \quad \mathfrak{g} = \mathfrak{G}_{n,r}^t(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}), \quad 2 \leq k \leq n-6, \quad t = \lfloor \frac{n-k-2}{2} \rfloor$$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, \dots, n-5 \\ [Y_0, Y_{n-3}] &= Y_{n-2}, \\ [Y_0, Y_{n-1}] &= Y_{n-3}, \\ [Y_1, Y_{n-1}] &= Y_{n-2} & \text{if } k=2 \\ [Y_i, Y_{n-4-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i &= 1, \dots, \frac{n-5}{2} \\ [Y_i, Y_{n-3-i}] &= (-1)^{i-1} \frac{n-3-2i}{2} Y_{n-3}, & i &= 1, \dots, \frac{n-5}{2} \\ [Y_i, Y_{n-2-i}] &= (-1)^i (i-1) \frac{n-2-i}{2} Y_{n-2}, & i &= 1, \dots, \frac{n-3}{2}, \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & i &= 1, \dots, t-1 \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j < n-2, \quad i+j \leq n-k-3 \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (1+k)\lambda_0, (2+k)\lambda_0, \dots, (n-5+k)\lambda_0, (n-5+2k)\lambda_0, (n-4+2k)\lambda_0, (n-6+2k)\lambda_0)$$

6. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{T}_{n,n-3}$ ($n \geq 6$, n pair),

(a) $\mathfrak{g} = \mathfrak{T}_{n,n-3}$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, \dots, n-4 \\ [Y_0, Y_{n-1}] &= Y_{n-2}, \\ [Y_i, Y_{n-3-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i &= 1, \dots, \frac{n-4}{2} \\ [Y_i, Y_{n-2-i}] &= (-1)^{i-1} \frac{n-2-2i}{2} Y_{n-2}, & i &= 1, \dots, \frac{n-4}{2} \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-4)\lambda_0 + \lambda_1, (n-4)\lambda_0 + 2\lambda_1, (n-5)\lambda_0 + 2\lambda_1)$$

(b) $\mathfrak{g} = \mathfrak{H}_{n,r}^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1})$, $2 \leq k \leq n-5$, $t = \lfloor \frac{n-k-1}{2} \rfloor$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, \dots, n-4 \\ [Y_0, Y_{n-1}] &= Y_{n-2}, \\ [Y_i, Y_{n-3-i}] &= (-1)^{i-1} Y_{n-1}, & i &= 1, \dots, \frac{n-4}{2} \\ [Y_i, Y_{n-2-i}] &= (-1)^{i-1} \frac{n-2-2i}{2} Y_{n-2}, & i &= 1, \dots, \frac{n-4}{2} \\ [Y_i, Y_{i+1}] &= \alpha_i Y_{2i+k}, & i &= 1, \dots, t-1 \\ [Y_i, Y_j] &= a_{i,j} Y_{i+j+k-1}, & 1 \leq i < j < n-2, i+j \leq n-k-2 \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, k\lambda_0, (1+k)\lambda_0, (2+k)\lambda_0, \dots, (n-4+k)\lambda_0, (n-4+2k)\lambda_0, (n-5+2k)\lambda_0)$$

7. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{E}_{9,5}^1$ alors $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{E}_{9,5}^1$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ [Y_0, Y_8] &= Y_6, & [Y_2, Y_8] &= -3Y_7, \\ [Y_1, Y_4] &= Y_8, & [Y_1, Y_5] &= 2Y_6, \\ [Y_1, Y_6] &= 3Y_7, & [Y_2, Y_3] &= -Y_8, \\ [Y_2, Y_4] &= -Y_6, & [Y_2, Y_5] &= -Y_7, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_0, 2\lambda_0, 3\lambda_0, 4\lambda_0, 5\lambda_0, 6\lambda_0, 7\lambda_0, 5\lambda_0)$$

8. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{E}_{9,5}^2$ alors $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{E}_{9,5}^2$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ [Y_0, Y_8] &= Y_6, & [Y_2, Y_8] &= -Y_7, \\ [Y_1, Y_4] &= Y_8, & [Y_1, Y_5] &= 2Y_6, \\ [Y_1, Y_6] &= Y_7, & [Y_2, Y_3] &= -Y_8, \\ [Y_2, Y_4] &= -Y_6, & [Y_2, Y_5] &= Y_7, \\ [Y_3, Y_4] &= -2Y_7, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_0, 2\lambda_0, 3\lambda_0, 4\lambda_0, 5\lambda_0, 6\lambda_0, 7\lambda_0, 5\lambda_0)$$

9. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{E}_{9,5}^3$ alors $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{E}_{9,5}^3$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ [Y_0, Y_8] &= Y_6, & [Y_1, Y_4] &= Y_8, \\ [Y_1, Y_5] &= 2Y_6, & [Y_2, Y_3] &= -Y_8, \\ [Y_2, Y_4] &= -Y_6, & [Y_2, Y_5] &= 2Y_7, \\ [Y_3, Y_4] &= -3Y_7, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_0, 2\lambda_0, 3\lambda_0, 4\lambda_0, 5\lambda_0, 6\lambda_0, 7\lambda_0, 5\lambda_0)$$

10. Si $\text{grg} \simeq \mathfrak{E}_{7,3}$ alors $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{E}_{7,3}$

$$\begin{aligned} [Y_0, Y_i] &= Y_{i+1}, & i &= 1, 2, 3, 4 \\ [Y_0, Y_6] &= Y_4, & [Y_2, Y_6] &= -Y_5, \\ [Y_1, Y_2] &= Y_6, & [Y_1, Y_3] &= Y_4, \\ [Y_1, Y_4] &= Y_5, \end{aligned}$$

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_0, 2\lambda_0, 3\lambda_0, 4\lambda_0, 5\lambda_0, 3\lambda_0)$$

Les paramètres $(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1})$ vérifient les relations polynomiales découlant des identités de Jacobi et les constantes $a_{i,j}$ vérifient le système:

$$\begin{aligned} a_{i,i} &= 0, \\ a_{i,i+1} &= \alpha_i, \\ a_{i,j} &= a_{i+1,j} + a_{i,j+1}. \end{aligned}$$

Dans la démonstration du théorème, on souligne les cas où grg est isomorphe à $L_{n-1} \oplus \mathbb{C}$ et à $\text{grg} \simeq \mathfrak{L}_{n,r}$, pour les autres cas la méthode est analogue.

Démonstration. Supposons que $\mathfrak{g}$ est du type t_1 , alors son algèbre graduée est isomorphe à $\mathfrak{L}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$ ou bien à $\mathfrak{Q}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$.

Soit f une dérivation diagonale de $\mathfrak{g}$ et considérons $\{X_0, X_1, \dots, X_{n-1}\}$ une base adaptée de $\mathfrak{g}$. On peut trouver trois vecteurs propres de f , notés Y_0, Y_1, Y_{n-1} , n'appartenant pas à l'algèbre dérivée et tels que:

$$\begin{aligned} Y_{n-1} &= c_{n-1}X_{n-1} + c_0X_0 + c_1X_1 + \sum_{i=2}^{n-2} c_iX_i, \\ Y_0 &= a_{n-1}X_{n-1} + a_0X_0 + a_1X_1 + \sum_{i=2}^{n-2} a_iX_i, \\ Y_1 &= b_{n-1}X_{n-1} + b_0X_0 + b_1X_1 + \sum_{i=2}^{n-2} b_iX_i, \end{aligned}$$

avec

$$\det \begin{pmatrix} c_{n-1} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ c_0 & a_0 & b_0 \\ c_1 & a_1 & b_1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

On peut alors choisir Y_0 et Y_1 de façon que $\Delta = \det \begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ a_1 & b_1 \end{pmatrix}$ soit non nul.

Quand grg est isomorphe à $\mathfrak{L}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$, on pose:

$$Y_{i+1} = [Y_0, Y_i] = (a_0b_1 - a_1b_0)X_{i+1} + \sum_{k=i+2}^{n-2} \gamma_{i+1}^k X_k, \quad i = 1, \dots, n-3$$

On en déduit que $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-1}\}$ est une base de vecteurs propres de f . Si $\lambda_{n-1}, \lambda_0, \lambda_1$ sont les valeurs propres de f associées respectivement aux vecteurs

propres Y_{n-1}, Y_0, Y_1 , alors Y_i est un vecteur propre de f avec valeur propre $(i-1)\lambda_0 + \lambda_1$ pour $i = 1, \dots, n-2$.

La matrice de changement de variable de la base adaptée $\{X_{n-1}, X_0, X_1, \dots, X_{n-2}\}$ à la base de vecteurs propres de f , $\{Y_{n-1}, Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-2}\}$, est la suivante:

$$\begin{pmatrix} \begin{array}{ccc|c} c_{n-1} & a_{n-1} & b_{n-1} & 0 \\ c_0 & a_0 & b_0 & \\ c_1 & a_1 & b_1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \Delta \\ & & & \vdots \\ & & & \ddots \\ & & & \Delta \end{array} \end{pmatrix}$$

On remarque que le déterminant de cette matrice est non nul et on calcule les crochets restants dans la base de vecteurs propres $\{Y_{n-1}, Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-2}\}$.

Comme $[Y_0, Y_{n-1}] \in \mathfrak{g}_3$ et f est une dérivation, on peut supposer que $[Y_0, Y_{n-1}] = 0$ en faisant, si nécessaire, un changement de variable sur Y_{n-1} . Par ailleurs, $[Y_1, Y_{n-1}]$ appartient aussi à $\mathfrak{g}_3$ alors:

$$[Y_1, Y_{n-1}] = \sum_{i=3}^{n-2} d^i Y_i$$

En imposant que f est une dérivation, on obtient que:

$$[(i-1)\lambda_0 - \lambda_{n-1}]d^i = 0 \quad i = 3, \dots, n-2$$

Si on considère en plus les conditions de Jacobi on trouve les cas suivants:

a) Lorsque $\lambda_{n-1} = l\lambda_0$ pour un certain $l \in \{2, \dots, n-3\}$, on obtient:

$$\begin{aligned} [Y_j, Y_{n-1}] &= Y_{l+j-2}, & 1 \leq j \leq n-l, \\ [Y_j, Y_{n-1}] &= 0, & n-l+1 \leq j \leq n-2. \end{aligned}$$

b) Si la condition antérieure ne se vérifie pas on trouve que:

$$[Y_j, Y_{n-1}] = 0, \quad 1 \leq j \leq n-2.$$

Dans ce dernier cas $\mathfrak{g}$ est de la forme $\mathfrak{g}' \oplus \mathbb{C}$ où $gr(\mathfrak{g}')$ est isomorphe à L_{n-1} puis, en utilisant des arguments similaires, on déduit que $\mathfrak{g}'$ est isomorphe à L_{n-1} ou bien elle est du type A_{n-1}^k . Par contre, dans le premier cas on obtient que $\mathfrak{g}$ est d'une des formes $L_{n-1} \oplus_l \mathbb{C}$ ou $A_{n-1}^k(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}) \oplus_l \mathbb{C}$, précisées dans l'énoncé du théorème.

Quand $gr\mathfrak{g}$ est isomorphe à $\mathfrak{Q}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$, le même changement de variable et une démonstration analogue nous permettent de déduire les résultats.

Supposons maintenant que $\mathfrak{g}$ est du type t_r avec $r \in \{3, \dots, n-2\}$. Si f est une dérivation diagonale de $\mathfrak{g}$ et $\{X_0, X_1, \dots, X_{n-1}\}$ une base adaptée

alors on peut trouver deux vecteurs propres de f , dénotés par Y_0 et Y_1 , qui n'appartiennent pas à l'algèbre dérivée et vérifiant:

$$\begin{aligned} Y_0 &= a_0 X_0 + a_1 X_1 + \sum_{i=2}^{n-1} a_i X_i, \\ Y_1 &= b_0 X_0 + b_1 X_1 + \sum_{i=2}^{n-1} b_i X_i, \end{aligned}$$

avec

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ a_1 & b_1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

On peut supposer que $a_0 = 1$.

Quand grg est isomorphe à $\mathfrak{L}_{n,r}$, on pose:

$$\begin{aligned} Y_{i+1} &= [Y_0, Y_i] \quad i = 1, \dots, n-3 \\ Y_{n-1} &= [Y_1, Y_{n-1}] \end{aligned}$$

et donc:

$$\begin{aligned} Y_i &= \Delta X_i + \sum_{k=i+1}^{n-1} \gamma_i^k X_k, \quad i = 2, \dots, r-1, \\ Y_i &= \Delta X_i + \sum_{k=i+1}^{n-2} \gamma_i^k X_k, \quad i = r+1, \dots, n-2, \\ Y_r &= \Delta(X_r + a_1 X_{n-1}) + \sum_{k=r+1}^{n-2} \gamma_r^k X_k, \\ r_{n-1} &= \Delta(b_0 X_r + b_1 X_{n-1}) + \sum_{k=r+1}^{n-2} \gamma_r^k X_k. \end{aligned}$$

La matrice de changement de base de $\{X_0, X_1, \dots, X_{r-1}, X_r, X_{n-1}, X_{r+1}, \dots, X_{n-2}\}$ à $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_{r-1}, Y_r, Y_{n-1}, Y_{r+1}, \dots, Y_{n-2}\}$ est la suivante:

$$\begin{pmatrix} 1 & b_0 & & & & & & & \\ a_1 & b_1 & & & & & & 0 & \\ \vdots & \vdots & \Delta & & & & & & \\ & & \vdots & \ddots & & & & & \\ & & & \Delta & \Delta b_0 & & & & \\ & & & \Delta a_1 & \Delta b_1 & & & & \\ & & & \vdots & \vdots & \Delta & & & \\ & & & & & \vdots & \ddots & & \\ & & & & & & & \Delta & \end{pmatrix}$$

$\{Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-1}\}$ est une base de vecteurs propres de f , si λ_0 et λ_1 représentent respectivement les valeurs propres associées aux vecteurs Y_0 et Y_1 alors, dans cette base, f est de la forme:

$$f \sim \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0 + \lambda_1, 2\lambda_0 + \lambda_1, \dots, (n-3)\lambda_0 + \lambda_1, (r-2)\lambda_0 + 2\lambda_1)$$

On calcule les crochets dans cette nouvelle base:

$$[Y_0, Y_{n-2}] = 0,$$

$$[Y_0, Y_{n-1}] = \begin{cases} \Delta b_0 Y_{r+1} + \sum_{k=2}^{n-2} c_k Y_{r+k} & \text{si } r \neq n-2 \\ 0 & \text{si } r = n-2 \end{cases}.$$

Si $r \neq n-2$, on impose que f est une dérivation:

$$f([Y_0, Y_{n-1}]) = [(r-1)\lambda_0 + 2\lambda_1][Y_0, Y_{n-1}] \Rightarrow \begin{cases} b_0(\lambda_1 - \lambda_0) = 0 \\ c_k(\lambda_1 - k\lambda_0) = 0 \end{cases} \text{ pour } k = 2, \dots, n-r-2$$

Si $2 \leq i \leq r-1$:

$$[Y_1, Y_i] = b_0 Y_{i+1} + \sum_{k=2}^{n-i-1} d_k Y_{i+k} \Rightarrow \begin{cases} b_0(\lambda_1 - \lambda_0) = 0 \\ d_k(\lambda_1 - k\lambda_0) = 0 \\ d_{n-i-1}\lambda_0 = 0 \end{cases} \text{ pour } k = 2, \dots, n-i-2$$

Si $r \leq i \leq n-3$:

$$[Y_1, Y_i] = b_0 Y_{i+1} + \sum_{k=2}^{n-i-2} d_k Y_{i+k} \Rightarrow \begin{cases} b_0(\lambda_1 - \lambda_0) = 0 \\ d_k(\lambda_1 - k\lambda_0) = 0 \end{cases} \text{ pour } k = 2, \dots, n-i-2$$

$$[Y_1, Y_{n-2}] = 0$$

$$[Y_1, Y_{n-1}] = b_0^2 Y_{r+1} + \sum_{l=3}^{n-r-1} e_l Y_{l+r-1} \Rightarrow \begin{cases} b_0(\lambda_1 - \lambda_0) = 0 \\ d_l(2\lambda_1 - l\lambda_0) = 0 \end{cases} \text{ pour } l = 3, \dots, n-r-1$$

Si $2 \leq i \leq \frac{r-1}{2}$:

$$[Y_i, Y_{r-i}] = (-1)^{i-1} (Y_{n-1} - b_0 Y_r) + \sum_{k=2}^{n-r-1} g_k Y_{r+k-1} \Rightarrow \begin{cases} b_0(\lambda_1 - \lambda_0) = 0 \\ g_k(\lambda_1 - k\lambda_0) = 0 \end{cases} \text{ pour } k = 2, \dots, n-r-1$$

Si $1 < i < j < n-1$ et $i+j \leq r-1$:

$$[Y_i, Y_j] = \sum_{k=2}^{n-i-j} h_k Y_{k+i+j-1} \Rightarrow \begin{cases} h_k(\lambda_1 - k\lambda_0) = 0 \\ h_{n-i-j}\lambda_0 = 0 \end{cases} \text{ pour } k = 2, \dots, n-i-j-1$$

Si $1 < i < j < n-1$ et $i+j \geq r+1$:

$$[Y_i, Y_j] = \sum_{k=2}^{n-i-j-1} h_k Y_{k+i+j-1} \Rightarrow h_k(\lambda_1 - k\lambda_0) = 0 \text{ pour } k = 2, \dots, n-i-j-1$$

Si $1 < i < n - 1$:

$$[Y_i, Y_{n-1}] = \sum_{l=3}^{n-i-r} p_l Y_{l+i+r-2} \Rightarrow p_l(2\lambda_1 - l\lambda_0) = 0 \text{ pour } l = 3, \dots, n-i-r$$

Ces calculs nous font envisager différentes possibilités, en considérant, en plus, les conditions de Jacobi.

1. Si $\lambda_1 = \lambda_0$, il suffit de faire le changement de variable $Y_1 \rightarrow Y_1 - b_0 Y_0, Y_{n-1} \rightarrow Y_{n-1} - b_0 Y_r$ pour trouver l'algèbre $\mathfrak{L}_{n,r}$
2. Si $\lambda_0 = 0$, on peut supposer $\lambda_1 = 1$ et il existe un changement de variable avec lequel on obtient l'algèbre $\mathfrak{L}_{n,r}$.
3. Si $\lambda_1 = k\lambda_0$ avec $2 \leq k \leq n - 4$, on obtient une algèbre du type $\mathfrak{C}_{n,r}^t(\alpha_1, \dots, \alpha_{t-1})$ où $t = \lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$.
4. Si $2\lambda_1 = (2k+1)\lambda_0$ avec $1 \leq k \leq \lfloor \frac{n-r-2}{2} \rfloor$, on obtient une algèbre du type $\mathfrak{g} = \mathfrak{D}_{n,r}^t$.

Dans le reste des cas, le même changement de variable nous permet d'obtenir les familles d'algèbres décrites dans le théorème 2. ■

Remarque 3 *Sauf isomorphisme, il y a seulement deux algèbres quasi-filiformes de rang 3, respectivement isomorphes à $\mathfrak{L}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$ et à $\mathfrak{Q}_{n-1} \oplus \mathbb{C}$.*

Les algèbres quasi-filiformes de rang 2 sont $\mathfrak{L}_{n,r}, \mathfrak{Q}_{n,r}, \mathfrak{T}_{n,n-4}, \mathfrak{T}_{n,n-3}$ ou bien de la forme 1b, 1c, 2b, 2c, 2f, 2g d'après la terminologie du théorème 2.

Les algèbres quasi-filiformes de rang 1 sont $\mathfrak{C}_{9,5}^1, \mathfrak{C}_{9,5}^2, \mathfrak{C}_{9,5}^3, \mathfrak{C}_{7,3}$ ou bien correspondent à un des algèbres du type 1d, 2d, 2e, 3b, 3c, 4b, 4c, 5b, 6b décrites dans le théorème 2.

References

- [1] G. Favre, Système des poids sur une algèbre de Lie nilpotente, Manuscripta Math. **9** (1973), 53-90.
- [2] J.R. Gómez, A. Jiménez-Merchán, Naturally graded quasi-filiform Lie algebras, J. Algebra 256 (2002) 221-228.
- [3] M. Goze, J. M. Ancochea, On the classification of rigid Lie algebras, J. Algebra 245 (2001), 68-91.
- [4] M. Goze, Y. Hakimjanov, Sur les algèbres de Lie nilpotentes admettant un tore de dérivations, Manuscripta Math. 84 (1994) 115-124.
- [5] M. Goze, E. Remm, Valued Deformations of Algebras, J. Alg. Appl. 3 (2004) 345-365.

- [6] A. I. Mal'cev, Solvable Lie algebras, *Izv. Akad. Nauk SSSR* 9 (1945), 329-356.
- [7] M. Vergne, Cohomologies des algèbres de Lie nilpotentes. Application à l'étude de la variété des algèbres de Lie nilpotentes, *Bull. Soc. Math. France* 98 (1970) 81-116.

Remerciements

L'auteur est soutenue par le projet de recherche MTM2006-09152 du Ministerio de Educación y Ciencia, et remercie aussi la Fundación Ramón Areces pour financer sa bourse prédoctorale.